



Allergi mot husdammskvalster

Allergisk rinit och allergisk astma har ett samband

- Ca 10 % av den svenska befolkningen lider av husdammskvalsterallergi⁴
- Nästan 50 % av alla patienter med luftvägsallergi mot husdammskvalster har både allergisk rinit och allergisk astma⁵
- Astman är ofta moderat till svår⁶

Symtom året runt

Allergi mot husdammskvalster har inte någon avgränsad säsong som t.ex. pollenallergi. Några patienter upplever möjligtvis större besvär under höst och vinterhalvåret men generellt finns symtomen året om. Därför kopplar inte alltid patienten ihop symtomen med allergi.

Skylla astman på allergin?

Då husdammskvalsterallergi samtidigt ökar risken för att utveckla moderat till svår astma⁶ bör patienter som utreds med misstanke om astma samtidigt utredas för en eventuell underliggande allergi.



Husdammskvalster ingår i klassen spindeldjur som omfattar b.l.a. spindlar, skorpioner och lockespindlar

Husdammskvalster tillhör ordningen Acari. Därför namnet ACARIZAX®



ACARIZAX®

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

ACARIZAX® (allergenextrakt, husdammskvalster, *Dermatophagoides pteronyssinus* och *Dermatophagoides farinae*) frystorkad tablett i styrkan 12 SQ-HDM. Rx. F.

Indikation: Vuxna 18-65 år med anamnes och ett positivt sensibiliseringstest för husdammskvalster (hudpricktest och/eller specifikt IgE-test) med minst ett av följande villkor:

- ihållande måttlig till svår rinit vid allergi mot husdammskvalster, trots användning av symtomlindrande läkemedel
- astma vid allergi mot husdammskvalster, som inte är välkontrollerad med inhalationssteroider och samtidig mild till svår rinit vid allergi mot husdammskvalster. Patientens astmastatus ska noga utvärderas innan behandlingen påbörjas.

Dosering: En tablett dagligen. Rekommenderad behandlingstid är 3 år. Medicinsk övervakning vid första tablettens är en viktig säkerhetsåtgärd. Behandlingen bör initieras av läkare med erfarenhet av allergiska sjukdomar.

För ytterligare information samt priser se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 2015-11-12, ALK Nordic A/S, Danmark Filial, Box 10073, 434 21 Kungälv, Tel 0300 – 185 45.

Referenser:

1. ACARIZAX Produktresumé 12. november 2015
2. Brozek J et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2010 Revision. Journal of Allergy and Clinical Immunology 2010; 126 (3): 466-476
3. Gina pocket guide for Asthma Management and prevention (GINA), 2015
4. Astma och allergiförbundet, Allergifakta 2016
5. Knudsen TB et al. J. A 2009; 46: Asthma 91-94
6. Zureik M et al. BMJ 2002; 372(7361) 411-414
7. Hellings PVW et al. Allergy 2013; 68: 1-7

* *Dermatophagoides Pteronyssinus* och *Dermatophagoides Farinae*



ALK Nordic A/S
Box 10073, 434 21 Kungälv
T. 0300-185 45, info@alk.net

SE/AC6/2016_06

ACARIZAX® (*D. Ptr* och *D. Far.**)
Ny allergivaccination i tablettform
för behandling av allergi mot
husdammskvalster

ACARIZAX®
Välkommen hem



ACARIZAX® - Ny allergivaccination i tablettform för behandling av allergi mot husdammskvalster

ACARIZAX® - behandlar orsaken till allergi mot husdammskvalster, vilket ökar patientens tolerans mot dessa allergener.¹

Det skydd som **ACARIZAX®** ger medför **en förbättring av sjukdomskontrollen** både vid **allergisk rinit** och **allergisk astma**.¹

För patienten innebär det att **ACARIZAX®**:

- Lindrar symtom och minskar behovet av symptomatisk behandling¹
- Minskar risken för astmaexacerbationer^{1*}
- Ökar patientens livskvalitet¹

ACARIZAX® har en **väldokumenterad säkerhetsprofil** även hos patienter med icke välkontrollerad astma¹

ACARIZAX® gör att **fler patienter** kan behandlas med allergivaccination

- Kan tas hemma (den första tablett tas under läkarens övervakning)



* under nedtrappning av ICS



Allergisk rinit

Överväg ACARIZAX® - om din vuxna patient:

Ställ en diagnos

Har symtom året om. Exempel på symtom som kan indikera sensibilisering mot husdammskvalster:

- Symtom nästan året om (täppt näsa, nysningar, rinnande näsa på morgonen) ev. värre under höst- och vintermånaderna
- Andningsproblem på natten (hostar och snarkar)
- Ökade besvär vid kontakt med husdammskvalsterallergener – (t.ex. i samband med städning eller när man bäddar sängen, förvärrade symtom i andra miljöer som t.ex. sommarstugan, hotell m.m.)



Utred husdammskvalsterallergi med pricktest och/eller IgE

Bedöm svårighetsgraden

Har moderat till svår allergisk rinit. Diagnostiserats med husdammskvalsterallergi, men inte fått tillfredsställande behandling med symptomatisk medicin, har ett eller flera av dessa symtom:

- Påverkan på sömnen
- Påverkan på dagliga aktiviteter, sport/fritid
- Påverkan på skola eller arbete
- Besvärande symtom
- Och/eller VAS $\geq 5^7$



Vid moderat till svår allergisk rinit trots symptomlindrande behandling - överväg ACARIZAX®

Kontraindikationer

Har samtidigt astma. Astma utgör inget hinder för behandling med ACARIZAX®, men följande astmarelaterade kontraindikationer finns:

- $FEV_1 < 70\%$ av det förväntade värdet (efter adekvat farmakologisk behandling) vid initiering av behandlingen
- Svår astmaexacerbation under de senaste 3 månaderna
- Svår astma och pågående akut luftvägsinfektion (initiering bör skjutas upp tills infektionen avklingat)



Vid samtidig astma => bekräfta $FEV_1 > 70\%$



Astma

Överväg ACARIZAX® - om din vuxna patient har:

Bedöm astmakontrollen

Icke välkontrollerad astma trots inhalationssteroid-behandling (ICS) definierat som ett eller flera av följande symtom, se GINA frågeformulär:³

- Symtom under dagen > 2 gånger i veckan
- Vaknar på natten p.g.a. astma ≥ 1 gång i veckan
- Ökat bruk av astmamedicin > 2 gånger i veckan
- Begränsad aktivitetsnivå p.g.a. astma trots användning av ICS



Icke välkontrollerad astmapatient

Ställ diagnos

Klinisk historia som indikerar allergi mot husdammskvalster. Exempel på symtom:

- Allergisk rinit året om
- Andningsproblem på natten (hosta)
- Ökade besvär vid kontakt med husdammskvalsterallergener – (t.ex. i samband med städning eller när man bäddar sängen, förvärrade symtom i andra miljöer som t.ex. sommarstugan, hotell m.m.)



Allergiutredning - pricktest och/eller IgE

Kontraindikationer

Frånvaro av följande astmarelaterade kontraindikationer:

- $FEV_1 < 70\%$ av det förväntade värdet vid initiering (efter tillräcklig farmakologisk behandling)
- Allvarlig astmaexacerbation inom de senaste tre månaderna
- Akut luftvägsinfektion (initiering bör skjutas upp tills infektionen är borta)



Bedöm astmastatus före behandling med ACARIZAX®