

ACARIZAX® – تطعيم ضد الحساسية في شكل أقراص توضع تحت اللسان

الهدف الأساسي للتطعيم ضد الحساسية هو تزود جسمك بالمادة (المسببة للحساسية) التي تتحسس منها في صورة جرعات يتم التحكم فيها. ويُعالج سبب الحساسية من خلال مساعدة الجهاز المناعي على تحمل مُسبب الحساسية المُحدد.

ACARIZAX® هو تطعيم ضد الحساسية في شكل أقراص توضع تحت اللسان. ويحتوي على خلاصة مسبب حساسية قياسية مستخلصة من نوعين من عث الغبار وغالبًا ما يُسببان الحساسية. ويعالج الحساسية الناتجة عن عث الغبار من خلال الزيادة البطيئة لمدى تحمل جهازك المناعي لمسببات الحساسية الناتجة عن عث غبار المنزل. ويؤدي هذا إلى انخفاض الأعراض. وبعد الوصول إلى درجة تحمل مسبب الحساسية، ستحتاج إلى تناول أدوية أقل (أو عدم تناول أدوية في بعض الحالات) لتخفيف الأعراض.

الأقراص مُخصصة لعلاج البالغين الذين يبلغ عمرهم من 18 حتى 65 عامًا (التهاب الأنف التحسسي والربو التحسسي) والمراهقين الذين يبلغ عمرهم من 12 حتى 17 سنة (التهاب الأنف التحسسي). ويجب عليك اتباع تعليمات طبيبك بعناية للاستفادة بفعالية العلاج قدر الإمكان. **فترة العلاج هي 3 سنوات.**

العلاج باستخدام ACARIZAX®

إذا كان لديك أي أسئلة أو لم تكن متأكدًا من علاجك، فمن المهم التحدث إلى طبيبك قبل البدء في تناول الأقراص. وإذا كنت تعاني من الربو، فيجب عليك تناول أدوية الربو طوال فترة العلاج بالكامل على النحو الذي يحدده طبيبك.

يتم تناول ACARIZAX® مرة واحدة في اليوم

يمكنك بدء العلاج باستخدام ACARIZAX® طوال العام. ويستغرق العلاج 3 سنوات، قرص واحد يوميًا. كما يوصى بتناول القرص الأول تحت إشراف طبي والبقاء في مكتب الطبيب لمدة 30 دقيقة بعد تناول القرص. وذلك للتأكد من تناول القرص بطريقة صحيحة والتمكن من مناقشة الآثار الجانبية المحتملة ومعالجتها.

توخ الحذر عند تناول ACARIZAX® إذا كنت:

- كنت تعاني من التهاب فموي حاد أو جروح فموية. يجب عليك إيقاف العلاج حتى يُشفى فمك.
- في حالة التوقف عن تناول دواء ACARIZAX® لمدة تزيد عن 7 أيام، فيوصى بالاتصال بالطبيب قبل متابعة العلاج.
- تلقيت مؤخرًا تطعيمًا ضد الحساسية في شكل حقن وعانيت من آثار جانبية شديدة.
- تعاني من فرط حساسية لأي من المكونات الأساسية لأقراص ACARIZAX®.
- تعاني من الربو وتزداد الأعراض سوءًا عند تناول ACARIZAX®، فيجب عليك الاتصال بطبيبك.
- تعاني من الربو ومصاب بعدوى الجهاز التنفسي، على سبيل المثال الزكام. فيجب عليك إيقاف العلاج حتى تُشفى من العدوى.
- تعاني من الربو وعانيت من تفاقم حاد للربو خلال الثلاثة الشهور الماضية عند بدء تناول العلاج.

يجب عدم تناول ACARIZAX® إذا كنت تعاني من:

- ربو غير مضبوط أو حاد
- فرط حساسية لأي مادة موجودة في القرص
- مرض يؤثر على جهاز المناعة أو تعاني من السرطان
- حالات التهاب في الفم على سبيل المثال قروح أو بثور أو عدوى فطرية

علاج ACARIZAX® والحمل:

إذا أصبحت حاملاً خلال فترة تناول العلاج، فيرجى الاتصال بطبيبك، الذي سيحدد ما إذا كان الاستمرار في تناول علاجك مناسباً أم غير مناسب لك.

كيفية تناول ACARIZAX®

- أخرج القرص من العبوة الفقاعية مستخدماً أصابع جافة.
- ضع القرص تحت لسانك. و غير مكان القرص بين الجانب الأيمن والأيسر.
- يذوب القرص في غضون بضع ثوان.
- لا تبلع بعد دقيقة واحدة من تناول القرص.
- انتظر لمدة 5 دقائق قبل تناول الطعام أو الشراب.
- يُعد شطف فمك بعد 5 دقائق فكرة صائبة.
- إذا نسيت تناول أحد الأقراص، يمكنك تناوله في وقت لاحق في اليوم نفسه. لا تتناول قرصين لتعويض قرص نسيت تناوله، استمر في تناول قرص واحد يومياً كالمعتاد.
- تجنب تفريش أسنانك قبل تناول القرص. وانتظر بعد تناوله.
- تجنب خدش عينيك أو لمسهما إذا كنت قد وضعت قرصاً في يدك.

اتبع تعليمات طبيبك

لتقليل أعراض الحساسية والتأكد من استمرار تأثير العلاج، يحتاج جسمك إلى زيادة درجة تحمل المادة التي تتحسس منها، ببطء وعلى مدى فترة طويلة من الوقت. ومن المهم تذكر تناول قرص واحد يوميًا، بما في ذلك الأيام التي لا تعاني فيها من أي أعراض. وللحصول على أفضل نتائج ممكنة للعلاج، من المهم اتباع تعليمات الطبيب بدقة.

تذكر ما يلي عند تناول ACARIZAX®

- لا تفرش أسنانك قبل تناول القرص، ولكن فرشها بعد تناوله.
- إذا كنت تعاني من جفاف الفم، فاغسل فمك بالماء قبل تناول القرص.
- اغسل يديك قبل تناول القرص.
- اشطف فمك بعد 5 دقائق من تناول القرص.
- يمكنك تناول القرص وقتما تشاء خلال اليوم.
- لا تتناول قرصين في اليوم نفسه.
- يمكنك تناول مضادات الهيستامين إذا كنت تعاني من حكة في فمك عند بدء العلاج (يجب عليك دائمًا مناقشة هذا الأمر مع طبيبك قبل تناول مضاد الهيستامين).

• إذا كنت تعاني من أي مشكلات أو أعراض متعلقة بالحساسية، استخدم دواء الحساسية الخاص بك عند الضرورة.

الآثار الجانبية المحتملة

يمكن أن تعاني من آثار جانبية عند بدء تناول علاجك. وتمتد تلك الأعراض لدقائق وتصل إلى ساعات عند تناول قرص ACARIZAX®. بالنسبة إلى معظم الناس، ستتوقف الآثار الجانبية في غضون 1-3 أشهر من العلاج. وفي حالات نادرة، يمكن أن تستمر الآثار الجانبية وتكون خطيرة بحيث يجب عليك التوقف عن تناول العلاج.

- الحكة في الفم هي الأثر الجانبي الأكثر شيوعًا.
- قد تشعر أيضًا بالوخز، وغالبًا ما يكون تحت اللسان بعد تناول القرص على الفور.
- وتكون الآثار الجانبية الأخرى غير العادية هي الشعور بالحكة في أذنيك، والعطس، والتهاب الحلق، وتورم في الفم - عادة ما يكون تحت لسانك، وآلام في المعدة، وقيء، وتورم موضعي في الشفتين.

اتصل بطبيبك إذا كنت:

تعاني بشكل غير متوقع من آثار جانبية أكثر حدة، مثل صعوبة في التنفس أو البلع، أو الطفح الجلدي، أو تغير في صوتك، أو الدوار، أو ورم في حلقك.

• تعاني من الربو وتساء أعراض الربو لديك.

في جميع هذه الحالات، يجب عليك التوقف عن تناول ACARIZAX® حتى يقرر الطبيب عكس ذلك.

الأسئلة والإجابات

لماذا يوصى بتناول القرص الأول مكتب الطبيب؟

نوصي بتناول القرص الأول الخاص بك في عيادة الطبيب للتأكد من تناول القرص بشكل صحيح. كما يتيح ذلك أيضًا لك الفرصة لمناقشة أي آثار جانبية مع طبيبك، وتمكين الطبيب من معالجتها إذا لزم الأمر.

ما الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا؟

الحكة في الفم هي الأثر الجانبي الأكثر شيوعًا لعلاج ACARIZAX®. وتتضمن الآثار الجانبية الأخرى المحتملة لعلاج ACARIZAX® الحكة في أذنيك، والعطس، والتهاب الحلق، وتورم في فمك. وكما هو الحال في الحكة في الفم، هذه أمثلة لردود الفعل التحسسية التي عادة ما تدوم لفترة محدودة فقط عند بدء تناول علاجك. وعادة ما تستمر الآثار الجانبية لمدة دقائق إلى ساعات. وفي معظم الحالات، تتوقف بعد 1-3 أشهر من العلاج. يجب على طبيبك تقديم معلومات مفصلة لك حول علاجك ACARIZAX®، ولكن حتى تكون في الجانب الآمن، يجب عليك قراءة نشرة معلومات المريض الموجودة في العبوة قبل بدء تناول العلاج.

ما الذي ينبغي علي فعله إذا زادت أعراض الربو سوءًا؟

إذا كنت تعاني من الربو وزادت أعراض الربو سوءًا عند علاجك باستخدام ACARIZAX®، فيجب عليك الاتصال بالطبيب الذي سيقوم ما إذا كان يجب إيقاف علاجك أم لا. ومن المهم تناول علاج الربو الذي وصفه طبيبك.

حصلت من قبل على تطعيم ضد الحساسية الناتجة عن عث الغبار في شكل حقن. هل يمكنني تناول ACARIZAX®؟

إذا حصلت من قبل على تطعيم ضد الحساسية الناتجة عن عث الغبار في شكل حقن، فقد تكون أكثر عرضة لردود فعل مشابهة عند العلاج باستخدام ACARIZAX®. وإذا كان الأمر كذلك، يجب على طبيبك إجراء تقييم كامل قبل بدء العلاج.

ما الذي ينبغي علي فعله في حالة نسيان تناول قرص؟

إذا نسيت تناول أحد الأقراص، يمكنك تناوله في وقت لاحق في اليوم نفسه. لا تأخذ جرعة مزدوجة لتعويض القرص الذي نسيت تناوله.

هل يجب علي الاستمرار في تناول الأدوية للتخفيف من الأعراض عند تناول ACARIZAX®؟

يجب عليك الاستمرار في تناول الأدوية لتخفيف الأعراض عند الضرورة.

أعاني من الربو. هل يجب علي الاستمرار في تناول دواء الربو الخاص بي؟

نعم، يجب عليك الاستمرار في تناول علاج الربو الذي وصفه طبيبك.