

Uppdoseringsschema för allergen immunterapi - Alutard SQ

7-veckors uppdoseringsschema för allergen immunterapi

Flaska	Styrka SQ-E/ml	Vecka nr	Injektion nr	Volym ml	Dosering SQ-E
1	100	1	1	0,1	10
2	1 000		2	0,1	100
3	10 000		3	0,1	1 000
	10 000	2	4	0,2	2 000
	10 000		5	0,2	2 000
	10 000	3	6	0,5	5 000
	10 000		7	0,5	5 000
4	100 000	4	8	0,2	20 000
	100 000	5	9	0,4	40 000
	100 000	6	10	0,6	60 000
	100 000	7	11	1,0	100 000

15-veckors uppdoseringsschema för allergen immunterapi

Flaska	Styrka SQ-E/ml	Vecka nr	Injektion nr	Volym ml	Dosering SQ-E
1	100	1	1	0,2	20
	100	2	2	0,4	40
	100	3	3	0,8	80
2	1 000	4	4	0,2	200
	1 000	5	5	0,4	400
	1 000	6	6	0,8	800
3	10 000	7	7	0,2	2 000
	10 000	8	8	0,4	4 000
	10 000	9	9	0,8	8 000
4	100 000	10	10	0,1	10 000
	100 000	11	11	0,2	20 000
	100 000	12	12	0,4	40 000
	100 000	13	13	0,6	60 000
	100 000	14	14	0,8	80 000
	100 000	15	15	1,0	100 000

Överskridet tidsintervall mellan två besök under uppdoseringsfasen

Veckor mellan besöken	Dosering
upp till 2 veckor	Fortsätt uppdosering
2 - 3 veckor	Upprepa senaste given dos
3 - 4 veckor	Reducera dosen med 50% av senast given dos
> 4 veckor	Starta om uppdoseringen

Överskridet tidsintervall mellan två besök under underhållsfasen

Veckor mellan besöken	Dosering
upp till 8 veckor	Fortsätt med underhållsdosen
8 - 10 veckor	Reducera dosen till 75% av senast given dos
10 - 12 veckor	Reducera dosen till 50% av senast given dos
12 - 14 veckor	Reducera dosen till 25% av senast given dos
14 - 16 veckor	Reducera dosen till 10% av senast given dos
> 16 veckor	Starta om uppdoseringen

Rekommenderad dos i händelse av svullnader vid injektionsstället

Svullnad, maximal diameter Barn över 5 år	Svullnad, maximal diameter Vuxna	Rekommendation
< 5 cm	< 8 cm	Fortsätt uppdosering enligt tabell
5 - 7 cm	8 - 12 cm	Upprepa föregående dos
7 - 12 cm	12 - 20 cm	Reducera dosen till den som gavs en vecka innan
12 - 17 cm	> 20 cm	Reducera dosen till den som gavs två veckor innan
> 17 cm	-	Reducera dosen till den som gavs tre veckor innan