

Säkerhetsrutiner vid allergen immunterapi med Alutard SQ®

- Före injektion:**
- säkerställ att akututrustning och läkare är på plats
 - identifiera patienten
 - låt patienten blåsa PEF
 - kontrollera patientens allmäntillstånd
 - kontrollera tidsintervall från sista injektionen
 - kontrollera eventuella reaktioner från föregående injektion
 - kontrollera allergenet; rätt extrakt, styrka och dos
 - kontrollera medicinerings (t.ex. ordinerad antihistamin)

- Avstå från injektion:**
- vid infektion eller allmän sjukdomskänsla
 - vid svåra pollenbesvär eller andra allergibesvär
 - vid astmasymptom
 - vid symptomgivande pälsdjurskontakt de senaste dygnet
 - om annan vaccination getts de närmaste dygnet
 - vid hög stressnivå hos patienten

- Injektionsteknik:**
- vänd Alutard® SQ flaskan lugnt 8-10 gånger
 - injektionen ges djupt subkutant
 - aspirera före och under injektion
 - injektion ges långsamt (1 ml/min)
 - vid blodaspiration; avbryt injektionen, observera och ge patienten ny tid om extraktet hunnit ges
 - vaksamhet under behandlingen för uppkomst av snabba reaktioner

- Efter injektion:**
- patienten får inte lämna väntrummet och ska hållas under uppsikt
 - patienten ska informeras om att omedelbart informera personal om akut uppkomna
 - symptom under väntetiden
 - efter 30 min kontrolleras allmäntillstånd och eventuella lokal- och systemreaktioner
 - PEF-mätning
 - dokumentera reaktioner
 - patienten ska resterande dag undvika aktiviteter som ökar blodgenomblödningen,
 - t.ex. kraftig fysisk ansträngning, bastubad, alkohol
 - undvika kontakt med allergiframkallande allergen
 - boka tid för nästa behandling