

ACARIZAX®

Allergen immunterapi i tablettform för behandling av husdammskvalsterallergi. Tabletten innehåller standardiserat allergenextrakt från husdammskvalster, *Dermatophagoides pteronyssinus* och *Dermatophagoides farinae* (12 SQ-HDM).¹

INDIKATION

ACARIZAX® är indicerat för **barn och vuxna i åldern 5-65 år** baserat på anamnes och ett positivt sensibiliseringstest för husdammskvalster (hudpricktest och/eller specifikt IgE-test) med :

- ihållande måttlig till svår **rinit vid allergi** mot husdammskvalster, trots användning av symptomlindrande läkemedel.

och/eller

- **astma vid allergi** mot husdammskvalster (**för vuxna i åldern 18-65 år**) som inte är välkontrollerad med inhalationssteroider och samtidig mild till svår rinit vid allergi mot husdammskvalster. Patientens astmastatus ska nogra utvärderas innan behandlingen påbörjas.



INLEDA BEHANDLING MED ACARIZAX®

Behandling kan startas under hela året. Det rekommenderas att första tablett tas under medicinsk övervakning och att patienten övervakas under minst en halvtimme, för att möjliggöra diskussion och eventuell behandling av omedelbara biverkningar.

Klinisk effekt kan förväntas efter 8-14 veckor från påbörjad behandling. Om ingen effekt uppnås efter 1 år, finns ingen indikation för fortsatt behandling.¹



- Tabletten tas ut ur blisterförpackningen med torra fingrar. **Tryck inte tablettan genom folien**, det kan skada tablettan eftersom den är spröd. Vik istället upp folien från det markerade hörnet och dra sedan av folien.
- Tabletten placeras under tungan, där den löses upp på några få sekunder.
- Undvik att svälja 1 minut efter tablettan tagits.
- Undvik att äta och dricka i 5 minuter efter tablettan tagits.
- Tabletten tas en gång om dagen i 3 år.

Lokala allergiska reaktioner är den vanligaste orsaken till att patienterna avbryter behandlingen. Därför är det viktigt att informera patienterna om vilka reaktioner de kan förvänta sig och vad som kan göras för att minska besvären.³

KONTRAINDIKATIONER

- Patienter med $FEV_1 < 70\%$ av det förväntade värdet (efter adekvat farmakologisk behandling) vid initiering av behandlingen.¹
- Patienter som haft en svår astmaexacerbation under de senaste 3 månaderna.¹
- Hos patienter med astma och pågående akut luftvägsinfektion, bör initiering av behandling med ACARIZAX® skjutas upp tills infektionen avklingat.¹
- Patienter med aktiva eller dåligt kontrollerade autoimmuna sjukdomar, immundefekter, immunbrist, immunsuppression eller malignt neoplastiska sjukdomar med aktuell sjukdomsrelevans.¹
- Patienter med akut, svår oral inflammation eller sår i munhålan.¹
- Överkänslighet mot något hjälpämne.¹

BIVERKNINGAR

ACARIZAX® tolereras väl och har en säkerhetsprofil som möjliggör medicineri i hemmet. Patienten bör informeras om att milda till måttliga lokala allergiska reaktioner kan inträffa inom de första dagarna.²

Vanligen startar reaktionen inom 5 minuter efter intag av ACARIZAX® och avtar efter några minuter till timmar. Biverkningarna försvinner oftast efter 1-3 månader vid fortsatt behandling. Mer allvarliga orofaryngala allergiska reaktioner kan förekomma.¹

Ett sätt att underlätta biverkningar är att tidigt uppmärksamma dem och behandla med symtomlindrande läkemedel (t ex antihistamin).²

ACARIZAX® - ETT BEHANDLINGSLTERNATIV FÖR PATIENTER SOM BESVÄRAS AV KVALSTERALLERGI ^{1,2}

- **För patienten innebär det att ACARIZAX®:**
 - Lindrar symtom och minskar behovet av symtomlindrande läkemedel^{1,2,4*}
 - Minskar risken för astmaexacerbationer^{5**}
 - Ökar patientens livskvalitet^{2,4*}
- **ACARIZAX® har en väldokumenterad säkerhetsprofil*, även hos patienter utan välkontrollerad astma.^{1**}**
- **ACARIZAX® ökar tillgängligheten till allergen immunterapi**
 - Kan tas hemma.¹

*Indikation allergisk rinit 5-65 år, **Indikation allergisk astma 18-65 år

Referenser: 1. ACARIZAX® produktresumé, 2. Demoly P et al., J Allergy Clin Immunol 2016;137(2): 444-451, 3. Kiotseridis et al. Primary Care Respiratory Medicine (2018) 28;4; doi:10.1038/s41533-018-0072-z, 4. Schuster et al. The Lancet Regional Health – Europe 2025;48: 101136, 5. Virchow JC et al. JAMA 2016; 315(16): 1715-1725 @

ACARIZAX® (allergenextrakt, *Dermatophagoides pteronyssinus* och *Dermatophagoides farinae*) frystorkad sublingual tablett, 12 SQ-HDM. Rx. F.

Indikation: Vuxna 18-65 år med anamnes och ett positivt sensibiliseringstest för husdammskvalster (hudpricktest och/eller specifikt IgE-test) med minst ett av följande villkor:

- ihållande måttlig till svår rinit vid allergi mot husdammskvalster, trots användning av symtomlindrande läkemedel

- astma vid allergi mot husdammskvalster, som inte är välkontrollerad med inhalationssteroider och samtidig mild till svår rinit vid allergi mot husdammskvalster. Patientens astma-status ska noga utvärderas innan behandlingen påbörjas.

Barn 5-17 år med anamnes och ett positivt sensibiliseringstest för husdammskvalster (hudpricktest och/eller specifikt IgE-test) med ihållande måttlig till svår rinit vid allergi mot husdammskvalster, trots användning av symtomlindrande läkemedel.

Kontraindikationer: Överkänslighet mot något hjälpämne. FEV₁ <70% av förväntade värdet (efter adekvat farmakologisk behandling) vid initiering av behandling. Svår astma-exacerbation senaste 3 månaderna. Vid astma och pågående akut luftvägsinfektion bör initiering av behandling skjutas upp. Aktiva eller dåligt kontrollerade autoimmuna sjukdomar, immundefekter, immunbrist, immunsuppression, eller maligna neoplastiska sjukdomar med aktuell sjukdomsrelevans. Akut, svår oral inflammation eller sår i munhålan. Senaste översyn av produktresumén: 2025-01-10. För ytterligare information samt priser se www.fass.se.



ALK, Box 10073, 434 21 Kungsbacka
Tlf. 0300-185 45, www.alk.se